

## Allgemeine Düngeempfehlung für den Maßnahmenraum „Hofbieber-Nüsttal“

(entspricht nicht der Düngebedarfsermittlung nach DüV)

Stand 14.04.2021

Frucht (Ertragsdurchschnitt der letzten 5 Jahre)	N-Bedarf nach DüV [kg N/ha]	Anzahl Flächen <sup>1)</sup>	N <sub>min</sub> -Gehalt (kg N/ha) Summe 0-90 cm	N- Bodennach- lieferung	N-Nachlieferung aus Vor- frucht/Zwischenfrucht/ anrechenbare N-Aufnahme des Bestands über Winter	N-Düngeempfehlung			Schwefel (kg S/ha)
						Organische Düngung <sup>3)</sup>			
						unregel- mäßig	mind. 1- mal in 3 Jahren	mind. 2- mal in 3 Jahren	
Alle Flächen		<b>43</b>	<b>15</b>						
A/B-WW (75 dt/ha) nach Mais	220	4	22	18	5	165	155	145	20-30
Wintergerste (75 dt/ha) nach Getreide	185	7	12	18	5	140	130	120	
Triticale (70 dt/ha)	190	9	19	18	10	133	123	113	
Winterroggen (70 dt/ha)	170	4	18	18	5	119	109	99	
Sommergerste (60 dt/ha)	150	2 ! <sup>2)</sup>	33	18	20	69	59	49	25-30
Silomais (500 dt/ha)	210	16	27	50	20	113	103	93	20-30

1) für die übrigen Früchte ist der Stichprobenumfang für eine allgemeine Aussage zu gering

2) ! Achtung sehr geringer Stichprobenumfang!

3) Mindestens aber müssen 10 % des Gesamt-N aus dem Vorjahr angerechnet werden.

- **Entnahme der Bodenproben: 02. März 2021 bzw. 29. März 2021**
- Bei **Wintergetreide** wurde jeweils eine durchschnittliche Bestandsentwicklung angenommen. Die erste Gabe an die Entwicklung des Bestandes anpassen. Dichte, gut entwickelte Bestände um 10 kg N/ha reduziert andüngen.
- Für **Braugerste** die empfohlene Düngung zu Sommergerste um 20 kg N/ha reduzieren.

Bitte beachten Sie für Ihre Schläge die **schlagbezogenen Düngeempfehlungen**,  
die teilweise erheblich von den allgemeinen Düngeempfehlungen abweichen können!

**→ für Schossergabe bitte Chlorophyllmessung anfordern und berücksichtigen ←**